



ՆՈՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՆՐԵՍ  
Հատոր 2, համար 1, 2008թ.



www.ysmu.am

**ԾԽԵԼՈՒ ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ  
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄԵՎ  
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ  
ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՍԱՐ  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ, 2006**

Բազարյան Ա.Ա.<sup>1\*</sup>, Ուորրեն Չ. Վ.<sup>2.</sup>, Ջոնս Ն. Բ.<sup>2.</sup>, Ասմա Ս<sup>2.</sup>

- (1) Հայաստան, Երևան, Ազգային առողջապահության ինստիտուտ  
(2) ԱՄՆ, Ատլանտա, Ջորջիա, Հիվանդացությունների կանխարգելման և հետազոտման  
կենտրոնի ծխելու և առողջության գրասենյակ

**Ամփոփում**

Մեր հետազոտությունները, անցկացրած 2006 թ. Հայաստանում բժշկական ուսումնական հաստատությունների 3-րդ կուրսերի ուսանող-բժիշկների շրջանում համատեղ միջազգային կազմակերպությունների հետ, հաստատեցին, որ նրանց մոտ ծխելու տարածվածության մակարդակը բավականին բարձր է՝ սկսած 28,6 % (ուսանող-ստոմատոլոգ) մինչև 7,2 % (բժշկական ուսումնարան): Հետազոտությունների արդյունքները ցույց տվեցին, որ ուսանող-բժշկի 20 %-ից քիչը ուսուցում ստանում են, որպեսզի հետագայում աջակցեն խնամյալներին՝ դադարեցնելու ծխելը, չնայած նույն այդ ուսանողների 90 %-ը ցանկություն են հայտնում, որպեսզի նման ուսուցումը ներառվի ծրագրերի մեջ: Անցկացված հետազոտությունների արդյունքում ակնհայտ է դառնում, որ միջազգային միջոցառումները, խնամյալների հետ ծխելու հարցով դադարեցման խորհրդատվությունը՝ կապված մշակման, փորձարկման և ներդրված ուսումնական ծրագրերում, պետք է իրականացվի ՀՀ ԱՆ և ԳԿ նախարարությունների համատեղ ուժերով:

**Հանգուցային բառեր.** ծխում, տարածվածություն, ուսանողներ, ուսումնական ծրագրեր, խորհրդատվություն, օգնություն: